

UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA DEL CCOU INSTRUCTIVO PARA FIBROCOLONOSCOPIA

Estimado socio:

La finalidad del presente es informarle lo más completamente posible, sobre las características del estudio endoscópico que su médico le ha indicado. Consiste en estudiar directamente, la superficie interna del recto y colon (intestino grueso) en sus diferentes sectores, viendo a través de un fibroscopio. El fibrocolonoscopia es un moderno instrumento, flexible, provisto de luz y fibras ópticas que permite observar desde el exterior, las características del intestino grueso, una vez que se comienza a introducir por el ano.

Para ello es fundamental e imprescindible que el intestino grueso sea preparado adecuadamente para que no contenga materias fecales que obstaculicen la visión al tapar el lente del fibroscopio.

DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

Si toma medicamentos con hierro o carbón (Iberol, Ferrol, Ferro, Foliculina) los suspenderá 3 días antes. Si toma anticoagulantes y/o antiagregantes o tiene insuficiencia renal, consulte a su médico. Desde 3 días antes realizará una dieta **sin verduras ni frutas**. 24 horas antes sólo líquidos (agua, té, caldo, jugo, gelatina, mate).

LOS DIAS PREVIOS :

SI EL ESTUDIO ESTÁ COORDINADO EN LA MAÑANA:

48 Hs ANTES: en la mañana, toma 2 comprimidos juntos con un poco de agua de Suadolín.

24 Hs ANTES: en la mañana 2 comprimidos de Suadolín con un poco de agua y luego (también en la mañana) un frasco de Fleet seguido de 2 o 3 vasos de agua.

En la tarde previa al estudio: otro frasco de Fleet seguido de 2 o 3 vasos de agua.

SI EL ESTUDIO ESTA COORDINADO EN LA TARDE:

48 Hs ANTES: en la mañana, toma 2 comprimidos de Suadolín juntos con un poco de agua.

24 Hs ANTES: en la mañana 2 comprimidos de Suadolín con un poco de agua y un frasco de Fleet seguido de 2 o 3 vasos de agua.

En la tarde previa al estudio: otro frasco de Fleet seguido de 2 o 3 vasos de agua.

EL DIA DEL ESTUDIO:

- Desayunar té o café sin leche.
- Puede tomar líquidos sin efervescencia hasta una hora antes **de ser realizado sin anestesia**.
- La duración del examen es variable, de 15 min a una hora, dependiendo de su colaboración así como las características propias de su intestino grueso (longitud, flexuosidades, angulaciones, adherencias), así como la ausencia o presencia de materias fecales.
- Durante la fibrocolonoscopia es posible tomar biopsias (obtener muestras pequeñas) de inflamaciones de colon o de pólipos (crecimientos localizados de las mucosa, de diferentes tamaños), e incluso extirparlos (polipectomía) y evitando intervenciones quirúrgicas con anestesia general, o si estuviera indicada, aconsejar las mismas para completar un tratamiento.
- Si se le realizó previamente un estudio radiológico del colon (Colon por Enema), concorra con las radiografías, ya que ambos estudios son complementarios.
- A usted se le entregará inmediatamente el informe de la endoscopia para que le lleve a su médico. Si no se lo ha llamado a la hora que fue citado, sepa disculparnos y no insista, pues seguramente se debe a alguna urgencia no prevista, o a la realización de procedimientos terapéuticos que han requerido algo más de tiempo, en los pacientes que le anteceden.
- Si luego de esta lectura queda con alguna duda, podrá consultar a los funcionarios que le otorgaron las horas, o directamente a nosotros el día de la Fibroscopia.
- **En caso de estar previsto que el estudio endoscópico se realice con anestesia, deberá concurrir con 6 (seis) horas de ayuno total y acompañado, quedando prohibido conducir luego del mismo.**